


Sandrena[®]

(半水合雌二醇)

如何使用 SANDRENA[®] 凝胶

- 请务必遵照医护专业人员关于剂量指导，并参阅患者信息说明书了解更多信息
- 将凝胶于室温下保存(低于 25°C)。



步骤 1

撕开包装袋。



步骤 2

- 隔日将凝胶涂抹于下半身或大腿干燥、清洁的皮肤上。
- 涂抹面积应为一只手掌大小的 1-2 倍。
- 该凝胶仅供经皮使用(即涂抹于皮肤)。




步骤 3

- 涂抹后让凝胶干燥几分钟。
- 涂抹后请用肥皂和水洗手。



步骤 4

- 涂抹部位在 1 小时内请勿清洗。
- 如果预计涂抹部位会与他人发生皮肤接触，则应在凝胶干燥后用衣物遮盖该部位，或在可能发生皮肤接触前淋浴。



- Sandrena[®] 凝胶只能涂抹于下半身或大腿。
- 请勿将凝胶涂抹于乳房、生殖器、面部或受刺激的皮肤上。
- 避免凝胶接触眼睛。



- 避免涂抹部位与其他人或宠物发生直接皮肤接触，尤其应避免与儿童发生此类接触。
- 如果其他人或宠物不小心接触到涂抹部位，请立即用肥皂和水清洗皮肤。
- 如果儿童接触到该部位，雌二醇可能发生转移，并可能引起意外的青春期征象(如乳房发育)。在大多数情况下，一旦儿童不再接触 Sandrena[®]，这些症状便会消退。

如果您出现任何副作用，请咨询您的医生、药剂师或护士。这包括药品说明书中未列出的任何可能出现的副作用。您也可以通过黄卡计划直接报告副作用：www.mhra.gov.uk/yellowcard
通过报告副作用，您可以帮助提供有关此药物安全性的更多信息。