


Sandrena[®]

(雌二醇半水合物)

如何使用 SANDRENA[®]凝膠

- 請務必遵循醫療保健專業人員的用藥指示，並參閱患者資訊手冊以了解詳情。
- 將凝膠於室溫 (低於 25°C) 環境下保存。



第 1 步

撕開包裝袋。




第 2 步

- 每隔一天將凝膠塗在下半身或大腿乾燥且清潔的皮膚上。
- 凝膠使用面積應為手掌大小的 1 至 2 倍。
- 本凝膠僅供經皮使用 (即塗抹於皮膚)。




第 3 步

- 塗抹後，讓凝膠自然風乾數分鐘。
- 塗抹後請用肥皂和清水洗手。



第 4 步

- 塗有凝膠部位在 1 小時內請勿清洗。
- 若預期會與他人有皮膚接觸，應在凝膠乾燥後以衣物遮蓋塗抹部位，或在可能接觸前先行沐浴。



- Sandrena[®] 凝膠僅限塗於下半身或大腿。
- 請勿將凝膠塗抹於乳房、生殖器、面部或受刺激的皮膚上。
- 避免凝膠觸及眼部。



- 避免塗有凝膠的部位直接接觸他人或寵物的皮膚，尤其是兒童。
- 若有其他人或寵物不慎觸及塗有凝膠的部位，請立即用肥皂和清水清洗皮膚。
- 若兒童接觸該部位，雌二醇有可能轉移，並可能產生意外的青春期體征 (例如，乳房發育)。大多數情況下，只要孩子不再接觸 Sandrena[®]，這些症狀即會消失。

若出現任何副作用，請諮詢您的醫師、藥劑師或護士。這包括任何藥品隨附單張中未有列出的可能副作用。您也可以透過黃卡計劃 (Yellow Card Scheme) 直接報告副作用：www.mhra.gov.uk/yellowcard
報告副作用有助提供更多關於本藥物安全性的資訊。