


Sandrena®

(œstradiol hémihydraté)

COMMENT APPLIQUER SANDRENA® GEL

- Suivez toujours les instructions de votre professionnel de santé concernant la posologie et reportez-vous à la notice d'information destinée aux patients pour plus d'informations.
- Conservez le gel à température ambiante (moins de 25 °C).




Ouvrez le sachet.



Appliquez le gel sur la peau sèche et propre du bas du corps ou de la cuisse. La surface d'application doit valoir 1 à 2 fois celle d'une main. Appliquez le gel sur un côté différent de votre corps chaque jour. Le gel est uniquement destiné à un usage transdermique (application sur la peau).



Après application, laissez sécher le gel pendant quelques minutes. Le site d'application ne doit pas être lavé dans l'heure qui suit.



Le gel Sandrena® doit être appliqué uniquement sur le bas du corps ou sur les cuisses. Le gel ne doit pas être appliqué sur les seins, les parties génitales, le visage ou une peau irritée. Ne laissez pas le gel entrer en contact avec les yeux.



Les mains doivent être lavées après application du gel.



Ne laissez pas les zones d'application entrer en contact avec la peau d'autres personnes ou d'animaux domestiques. Si un contact cutané avec d'autres personnes est prévu, recouvrez le site d'application d'un vêtement une fois le gel séché ou prenez une douche avant tout contact cutané éventuel.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique également à tout effet indésirable éventuel qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le programme Yellow Card sur www.mhra.gov.uk/yellowcard
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité de ce médicament.

