


Sandrena®

(hemihidrato de estradiol)

CÓMO APLICAR EL SANDRENA® GEL

- Siga siempre las instrucciones de su médico en cuanto a la dosis y consulte el prospecto de información para el paciente para obtener más información
- Conserve el gel a temperatura ambiente (por debajo de 25 °C).




Abra el sobre.



Aplique el gel sobre la piel seca y limpia de la parte inferior del cuerpo o del muslo. La superficie de aplicación debe ser de 1 a 2 veces el tamaño de una mano. Aplique el gel en una zona diferente del cuerpo cada día. El gel es solo para uso transdérmico (aplicación sobre la piel).



Después de la aplicación, deje que el gel se seque durante unos minutos. La zona de aplicación no debe lavarse durante 1 hora.



El Sandrena® gel solo debe aplicarse en la parte inferior del cuerpo o en los muslos. El gel no debe aplicarse en los senos, los genitales, la cara o la piel irritada. Evite el contacto del gel con los ojos.



Debe lavarse las manos después de la aplicación.



Evite el contacto de piel con piel en las zonas de aplicación con otras personas o con mascotas. Si se prevé el contacto de piel con otras personas, se debe cubrir la zona de aplicación con ropa después de que el gel se haya secado o ducharse antes del posible contacto.

Si experimenta algún efecto secundario, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en el prospecto. También puede informar de los efectos secundarios directamente a través del sistema Yellow Card en www.mhra.gov.uk/yellowcard
Al informar de los efectos secundarios, puede ayudar a que se disponga de más información sobre la seguridad de este medicamento.