


Sandrena®

(естрадіолу напівгідрат)

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ГЕЛЬ САНДРЕНА®

- Завжди дотримуйтесь інструкцій медичного фахівця щодо дозування та переглядайте інформаційний листок для пацієнтів для отримання додаткової інформації
- Зберігайте гель при кімнатній температурі (нижче 25°C).



Відкрийте пакетик.



Нанесіть гель на суху чисту шкіру нижньої частини тіла або стегон. Поверхня нанесення має бути в 1-2 рази більше долоні. Щодня наносьте гель з іншого боку тіла. Гель призначений тільки для трансдермального (нанесення на шкіру) застосування.



Після нанесення дайте гелю висохнути протягом декількох хвилин. Місце нанесення не слід мити протягом 1 години.



Гель Сандрена® слід наносити лише на нижню частину тіла або на стегна. Не слід наносити гель на молочні залози, статеві органи, обличчя та на подразнену шкіру. Уникайте потрапляння гелю в очі.



Після нанесення слід вимити руки.



Уникайте контакту ділянок нанесення «шкіра до шкіри» з іншими людьми або домашніми тваринами. Якщо очікується контакт шкіри з іншими особами, місце нанесення слід або накрити одягом після висихання гелю, або прийняти душ перед можливим шкірним контактом.

Якщо у вас виникли якісь побічні ефекти, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Це стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не зазначених у листку-вкладці. Ви також можете повідомити про побічні ефекти безпосередньо через «Схему жовтої картки» за адресою www.mhra.gov.uk/yellowcard. Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти отримати більше відомостей щодо безпеки цього медичного препарату.