


Sandrena®

(estradiol hemihydrate)

CÁCH SỬ DỤNG GEL SANDRENA®


- Luôn tuân thủ hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe về liều lượng và tham khảo tờ thông tin dành cho bệnh nhân để biết thêm thông tin
- Bảo quản gel ở nhiệt độ phòng (dưới 25°C).




Xé túi đựng.



Thoa gel lên vùng da khô và sạch ở phần thân dưới hoặc đùi. Bề mặt thoa phải bằng 1-2 lần kích thước của bàn tay. Mỗi ngày thoa gel lên một bên khác nhau của cơ thể. Gel chỉ được dùng để thoa ngoài da.



Sau khi thoa, để gel khô trong vài phút. Không nên rửa vùng thoa gel trong vòng 1 giờ.



Chỉ nên thoa gel Sandrena® vào phần thân dưới hoặc đùi. Không nên thoa vào ngực, bộ phận sinh dục, mặt hoặc vùng da bị kích ứng. Tránh để gel tiếp xúc với mắt.



Nên rửa tay sau khi thoa.



Tránh tiếp xúc da kề da ở vùng thoa gel với người khác hoặc vật nuôi. Nếu có nguy cơ tiếp xúc da với người khác, sau khi gel khô, nên che vùng thoa gel bằng quần áo hoặc tắm trước khi tiếp xúc với da.

Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy trao đổi với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá. Điều này bao gồm mọi tác dụng phụ có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ hướng dẫn sử dụng. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp qua

Chương trình Thẻ Vàng tại www.mhra.gov.uk/yellowcard

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về tính an toàn của loại thuốc này.

