

# كيفية استخدام جل SANDRENA® GEL


## Sandrena®

(استراديول نصف مائي)


- اتبعي دائماً تعليمات أخصائي الرعاية الصحية بشأن الجرعة واطلعي على نشرة معلومات المريض المرفقة لمزيد من المعلومات
- يُحفظ الجل في درجة حرارة الغرفة (أقل من ٢٥ °م).



بعد الاستخدام، دع الجل حتى يجف لبضع دقائق. تجنبي غسل المنطقة التي وضعت الجل عليها لمدة ساعة بعد الاستخدام.



ضعي الجل على بشرة نظيفة وجافة في الجزء السفلي من جسمك أو فخذك. يجب أن تغطي مساحة الجل مقدار من مرة إلى ضعف حجم يدك. ضعي الجل على جانب مختلف من جسمك يوميًا. الجل مخصص للاستخدام الموضعي على الجلد فقط (وضعه على البشرة).




افتحي العبوة بحرص.



احرصي على عدم ملامسة مناطق الاستخدام مباشرة مع الآخرين أو الحيوانات الأليفة. إذا كان من المحتمل حدوث تلامس جلدي مع الآخرين، فيجب تغطية المنطقة التي تم وضع الجل عليها بالملابس بعد جفاف الجل أو الاستحمام قبل التلامس.



يُنصح بغسل اليدين بعد الاستخدام.



استخدمي جل Sandrena® على الجزء السفلي من الجسم أو الفخذين فقط. تجنبي وضع الجل على الثديين أو الأعضاء التناسلية أو الوجه أو المناطق التهيجة من الجلد. تجنبي ملامسة الجل للعينين.

إذا عانيت من أي آثار جانبية، فتحدثي إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة لم تُذكر في النشرة المرفقة داخل العبوة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر مخطط البطاقة الصفراء على [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساهمة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

ORION  
PHARMA

Orion Pharma (UK) Ltd, Abbey Gardens, 4 Abbey Street, Reading, RG1 3BA, UK



مارس 2025/HRT-11(2)h