


Sandrena®

(półwodzian estradiolu)

SPOSÓB STOSOWANIA ŻELU SANDRENA®

- Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki informacyjnej.
- Przechowywać żel w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C).




Rozerwać saszetkę.



Nałożyć żel na suchą, czystą skórę dolnej części tułowia lub uda. Obszar aplikacji powinien być 1–2 krotnie większy od powierzchni dłoni. Każdego dnia żel należy aplikować na inny obszar ciała naprzemiennie. Żel przeznaczony jest wyłącznie do stosowania przezskórnego (na skórę).



Żel należy pozostawić do wyschnięcia na kilka minut. Miejsca aplikacji nie należy myć przez 1 godzinę po nałożeniu żelu.



Żel Sandrena® należy nakładać wyłącznie na dolną część tułowia lub uda. Nie należy nakładać żelu na piersi, narządy płciowe, twarz i podrażnioną skórę. Unikać kontaktu żelu z oczami.



Po użyciu żelu należy umyć ręce.



Unikać bezpośredniego kontaktu skóry do skóry z innymi osobami lub zwierzętami miejscu aplikacji żelu. Jeśli spodziewany jest kontakt skóra do skóry z innymi osobami, miejsce nałożenia preparatu należy osłonić ubraniem po wyschnięciu lub wziąć prysznic przed możliwym kontaktem.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Obejmuje to wszelkie możliwe działania niepożądane niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania.

Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio w ramach programu Yellow Card na stronie www.mhra.gov.uk/yellowcard Zgłaszanie działań niepożądanych pomaga w uzyskaniu większej ilości informacji na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku.

