

SANDRENA® جیل


استعمال کرنے کا طریقہ

Sandrena®

(ایسٹراڈیول ہیملی ہائیڈریٹ)




- خوراک کے حوالے سے ہمیشہ اپنے نگہداشت صحت کے پیشہ ور ماہرین کی ہدایات پر عمل کریں اور مزید معلومات کے لیے مریض کا معلوماتی کتابچہ دیکھیں
- جیل کو کمرے کے درجہ حرارت پر (25°C سے نیچے) ذخیرہ کریں۔



لگانے کے بعد جیل کو چند منٹوں تک خشک ہونے دیں۔ جس جگہ پر لگایا ہو اس جگہ کو 1 گھنٹے تک نہ دھوئیں۔



جیل کو اپنے جسم کے نچلے حصے یا ران کی خشک، صاف جلد پر لگائیں۔ لگانے کی سطح ہاتھ کے سائز سے 1-2 گنا بڑی ہونی چاہیے۔ جیل کو ہر روز اپنے جسم کے مختلف حصوں پر لگائیں۔ جیل صرف ٹرانسڈرمل استعمال (جلد پر لگانے) کے لیے ہے۔



ساشے کھولیں۔



جیل لگانے کے بعد متعلقہ جگہ کو دوسرے لوگوں یا پالتو جانوروں کے ساتھ جلد کے رابطے سے گریز کریں۔ اگر دوسروں کے ساتھ جلد کا رابطہ متوقع ہو، تو جیل کے خشک ہونے کے بعد متعلقہ جگہ کو یا تو کپڑے سے ڈھانپ لیں یا ممکنہ جلد کے رابطے سے پہلے غسل کر لیں۔



لگانے کے بعد ہاتھوں کو ضرور دھوئیں۔



Sandrena® جیل کو صرف اپنے جسم کے نچلے حصے یا صرف رانوں پر لگانا چاہیے۔ جیل کو چھاتیوں، جنسی اعضاء، چہرے یا جلن والی جلد پر نہیں لگانا چاہیے۔ جیل کو آنکھوں کے رابطے میں آنے سے بچائیں۔

اگر آپ کو کوئی ضمنی اثرات محسوس ہوں، تو اپنے ڈاکٹر، فارماسسٹ یا نرس سے بات کریں۔ اس میں وہ تمام ممکنہ ضمنی اثرات شامل ہیں جو پیکج کے کتابچے میں درج نہیں ہیں۔ آپ ضمنی اثرات کی اطلاع براہ راست ییلو کارڈ اسکیم کے ذریعے www.mhra.gov.uk/yellowcard پر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اس دوا کی حفاظت کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

ORION
PHARMA

Orion Pharma (UK) Ltd, Abbey Gardens, 4 Abbey Street, Reading, RG3 1BA, UK



مارچ 2025/HRT-11(2) ج